


Informação de segurança sobre o tratamento com:


Ahzantive▼ / **Baiama**▼ (aflibercept)

PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA


- 1 Administrar a anestesia tópica.




- 2 Instilar o desinfetante (ex.: solução de iodopovidona a 5% ou equivalente) nas pálpebras, rebordo das pálpebras e no interior do saco conjuntival. Não é necessária a dilatação do olho antes da injeção.




- 3 Com o cotonete estéril, aplicar o desinfetante (ex.: solução de iodopovidona a 10% ou equivalente) na pele periocular, pálpebras e pestanas, evitando uma pressão excessiva sobre as glândulas do olho.




- 4 Cobrir com um campo cirúrgico estéril e inserir o espéculo da pálpebra estéril (ou equivalente).



-
- 5** Dizer ao doente para olhar para o lado oposto ao do local de injeção. Posicionar o olho adequadamente. Numa área 3,5 – 4,0 mm posterior ao limbo, marcar um local de injeção.



-
- 6** Introduzir a agulha de injeção na cavidade do corpo vítreo, evitando o meridiano horizontal e procurando o centro do globo. O volume de injeção é então administrado; para as injeções seguintes deve usar-se um local escleral diferente.



Para mais informações sobre o procedimento de injeção intravítrea, consultar o Guia para o Médico e o Vídeo do procedimento de injeção intravítrea que o acompanha.

Para mais informações sobre estes medicamentos, consulte o Resumo das Características do Medicamento (RCM) disponível no sítio do INFARMED, I.P., em Infomed:

<https://extranet.infarmed.pt/INFOMED-fo/>